Disulfiram WZF

(Disulfiramum) **100 mg, tabletki do implantacji**

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować Państwa,
że Polfa Warszawa S.A. posiada
w swojej ofercie znany Państwu od lat
preparat ***Disulfiram WZF****,*
stosowany w leczeniu
uzależnienia od alkoholu.
Disulfiram WZF
wytwarzany jest w postaci
jałowych tabletek do implantacji.

Disulfiram WZF

- Jałowe tabletki do implantacji
- 4-letni okres ważności preparatu
- Opakowanie 10 tabletek
- Przechowywanie w temperaturze pokojowej

Wychodząc naprzeciw potrzebom Państwa pacjentów i ich najbliższych przekazujemy nasz produkt - Disulfiram WZF!

Z poważaniem

Małgorzata Jankiewicz
Product Manager

DISULFIRAM WZF 100 mg, tabletki do implantacji. Skład: Jedna tabletka do implantacji zawiera 100 mg *Disulfiramum* (disulfiramu). **Wskazania do stosowania:** Pomocniczo w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Produkt jest przeznaczony dla wybranych i współpracujących pacjentów, z zastosowaniem odpowiedniego leczenia wspomagającego. **Dawkowanie i sposób podawania:** Tabletki do implantacji znajdujące się w oryginalnym opakowaniu są jałowe. Lek wszczepia się podpowięziowo, rozmieszczając gwiaździście 8 do 10 tabletek. Zabieg można powtórzyć po 8 miesiącach. Tabletki przeznaczone do wszczepienia muszą być jałowe, nie mogą być uszkodzone, bez żadnych zanieczyszczeń. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na disulfiram i tiokarbaminiany. Stan upojenia alkoholowego, spożywanie napojów zawierających alkohol etylowy lub stosowanie preparatów zawierających alkohol w ciągu ostatnich 12 godzin przed zabiegiem. Stwierdzona niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, uprzednio przebyta niewydolność obwodowa krążenia. Zaburzenia psychiczne, psychozy (z wyjątkiem przebytych ostrych psychoz alkoholowych), próby samobójcze w wywiadach. Nie należy stosować preparatów zawierających disulfiram bez świadomej zgody pacjenta. **Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:** W okresie leczenia disulfiramem obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych. Spożycie alkoholu w trakcie stosowania disulfiramu może powodować wystąpienie objawów zagrażających życiu. Dlatego też preparat może być stosowany wyłącznie za zgodą pacjenta oraz pod warunkiem poinformowania go o zagrożeniach związanych ze spożyciem alkoholu w czasie stosowania leku. Lek można zastosować po przeprowadzeniu bardzo dokładnego wywiadu i rozważeniu wszystkich zalet i wad takiego leczenia alkoholizmu. Objawy nietolerancji alkoholu mogą wystąpić także po zastosowaniu płynów zawierających alkohol (np. płyny do płukania jamy ustnej, sosy, ocet, syropy przeciwkaszlowe, środki rozgrzewające, płyny po goleniu i inne kosmetyki zawierające alkohol). Podczas stosowania disulfiramu należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek, wątroby, chorobami układu oddechowego lub serca, cukrzycą, padaczką. Wystąpienie reakcji disulfiramowej może pogłębić stopień zaawansowania tych chorób. **Ciąża lub laktacja:** Ciąża: nie zaleca się stosowania disulfiramu w pierwszym trymestrze ciąży. Zalecając disulfiram pacjentkom w ciąży należy rozważyć stosunek korzyści z leczenia do ryzyka, biorąc pod uwagę działania niepożądane wywołane przez alkoholizm. Odnotowano rzadkie przypadki wrodzonych nieprawidłowości u niemowląt, których matki stosowały disulfiram w skojarzeniu z innymi lekami. Karmienie piersią: Nie stosować podczas karmienia piersią. Nie ma danych dotyczących przenikania disulfiramu do mleka kobiecego. Nie należy stosować disulfiramu podczas karmienia piersią, zwłaszcza gdy istnieje możliwość wystąpienia interakcji z preparatami, które może przyjmować dziecko. **Działania niepożądane:** Może wystąpić senność, nudności, wymioty, metaliczny posmak lub smak czosnku w ustach, przemijająca impotencja, pacjent może się łatwo męczyć. W rzadkich przypadkach odnotowywano reakcje psychotyczne, w tym stany depresyjne, paranoiczne, schizofrenię, manię. Odnotowywano skórne reakcje alergiczne, zapalenie nerwów obwodowych, uszkodzenie hepatocytów. **Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:** Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa, www.polfawarszawa.pl. **Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:** Pozwolenie nr R/1038. Pełna informacja o leku dostępna na życzenie. Lek wydawany na receptę. Odpłatność 100%.

LIST/DISULF/03.11.2011

Polfa Warszawa S.A.